

# Observar aves

Los amantes de la ornitología cada vez son más numerosos. Observar aves, desde las rapaces de mayor tamaño hasta los más frágiles pajarillos, es un ejercicio que encandila a muchos amantes de la naturaleza. La Comarca del Aranda, pese a su pequeño tamaño, cuenta con gran diversidad de paisajes y una amplia representación de especies de aves que, bien de forma permanente, bien sobrevolándonos en determinadas épocas del año, se dejan ver u oír en los diferentes ecosistemas de este territorio. En este plano hemos dividido las zonas de observación en tres ecosistemas: los forestales, con las Sierras del Moncayo, La Virgen y el Tablado; los cortados, cañones y barrancos del río Isuela y Aranda; y los ecosistemas húmedos y bosques ribereños del embalse de Maidevera y los ríos de la Comarca.



## ZONA FORESTAL

Sierra del Moncayo  
Sierra del Tablado  
Sierra de la Virgen

1. Águila calzada (*Aquila pennata*)
2. Águila real (*Aquila chrysaetos*)
3. Azor común (*Accipiter gentilis*)
4. Bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*)
5. Búho chico (*Asio otus*)
6. Culebrera europea (*Circaetus gallicus*)
7. Herrillito capuchino (*Lophophanes cristatus*)
8. Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)
9. Piquituerto (*Loxia curvirostra*)
10. Trepador azul (*Sitta europaea*)



## ZONA CORTADOS, CAÑONES

Río Isuela (Calcaena, Purujosa, Trasobares)  
Río Aranda (Gollizno, Brea de Aragón)  
Río Aranda (Nacimiento)

11. Águila perdicera (*Aquila fasciata*)
12. Águila real (*Aquila chrysaetos*)
13. Alimoche (*Neophron percnopterus*)
14. Búho real (*Bubo bubo*)
15. Buitre leonado (*Gyps fulvus*)
16. Collalba negra (*Oenanthe leucura*)
17. Halcón común o peregrino (*Falco peregrinus*)
18. Roquero rojo (*Monticola saxatilis*)
19. Roquero solitario (*Monticola solitarius*)
20. Treparriscos (*Tichodroma muraria*)



## ZONAS HÚMEDAS, RIBERAS

Río Isuela  
Río Aranda  
Embalse de Maidevera

1. Ánade real o azulón (*Anas platyrhynchos*)
2. Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*)
3. Focha común (*Fulica atra*)
4. Gallineta (*Gallinula chloropus*)
5. Garza real (*Ardea cinerea*)
6. Martín pescador (*Alcedo atthis*)
7. Mirlo acuático (*Cinclus cinclus*)
8. Orpéndola (*Oriolus oriolus*)
9. Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)
10. Somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*)

## SIMBOLOGÍA

- Gran Recorrido (GR)
- Pequeño Recorrido (PR)
- Sendero Local
- Calcenada de Primavera
- Calcenada de Otoño
- Ruta Senderista «Papa Luna»
- Ruta «Maestro Zapatero»
- Carretera Comarcal, Local y Autonómica
- Carretera Nacional
- Ríos
- Parque Natural del Moncayo
- Picos
- Albergue / Refugio
- Punto de Interés Turístico
- Escalada
- Pesca
- AVES ZONAS FORESTALES
- AVES ZONAS ROCOSAS
- AVES ZONAS HÚMEDAS

comarcadelaranda.com



Datos obtenidos de la web de la Sociedad Española de Ornitología, donde se pueden saber más datos de estas y otras especies de aves.



**AZOR COMÚN** (*Accipiter gentilis*)

**Longitud:** Entre 49 y 56 cm  
**Envergadura:** Entre 58 y 64 cm

**Hábitat:** Especie habitual y residente, que habita en ecosistema forestal, en gran variedad de bosques, desde el nivel del mar hasta los 2000 metros.

**Alimentación:** Su alimentación básica se nutre de aves medianas, especialmente córvidos y palomas; mamíferos como conejos, liebres o ardillas; y hasta algún reptil como los grandes lagartos.

**Características:** Presenta gran diferencia entre el macho y la hembra, siendo esta última algo más grande. Los machos cuentan con un plumaje grisáceo oscuro en el dorso, mientras que el pecho y la parte inferior de las alas muestran unas barras transversales. La hembra resulta más parda en el dorso y el barrado inferior es más grueso. El azor presenta una silueta muy característica, aunque no resulta fácil verlo salvo cuando se eleva de la espesura del bosque. Posee unas alas cortas, anchas y redondeadas y una cola muy larga, lo que le facilitan la movilidad con la que se desenvuelve en la espesura del bosque.

**CULEBRERA EUROPEA** (*Circaetus gallicus*)

**Longitud:** Entre 62 y 69 cm  
**Envergadura:** Entre 160 y 175 cm

**Hábitat:** Ave estival que emigra en invierno en busca del clima y las presas de África. Forestal, puede verse en diferentes bosques aunque con predilección por el bosque mediterráneo, desde el nivel del mar hasta los 1400 metros.

**Alimentación:** Está especializada en consumir reptiles, fundamentalmente ofidios, de ahí su nombre vulgar.

**Características:** Llama la atención por su cabeza voluminosa dotada de un corto y fuerte pico y grandes ojos amarillos orientados hacia el frente. Los adultos presentan plumaje claro en el vientre, barrado o moteado de colores pardos. El dorso es marrón más o menos oscuro y se extiende hasta la cabeza, el cuello y el pecho. Tiene una gran capacidad de vuelo, debido a la largura y anchura de sus alas y su cola. Puede permanecer largo tiempo cernida en el aire mientras otea sus posibles presas, algo que sorprende en un ave de tal envergadura.

**PICOGORDO** (*Coccothraustes coccothraustes*)

**Longitud:** 18 cm  
**Envergadura:** Entre 29 y 33 cm

**Hábitat:** Las poblaciones peninsulares pasan aquí el invierno, época en la que llegan hasta estas tierras aves del norte de Europa en busca de alimento en zonas forestales, sotos y bosques de ribera.

**Alimentación:** Basada en frutos y semillas grandes, cerezas, hayucos, escaramujos, no le hace ascos a las yemas y tallos tiernos de árboles y algún que otro insecto.

**Características:** Voluminosa cabeza y pico grueso que le da nombre, tiene un aspecto robusto, potenciado por su cola corta. Hay que observar muy bien sus diferencias para distinguir ambos sexos. Su cuerpo se tiñe de un color marrón claro que se oscurece en las alas hasta casi ennegrecer. La cabeza presenta mancha anaranjada, más viva en el macho, con antifaz y obispillo. Su presencia es muy característica de ambientes mediterráneos. Puede verse en muchas zonas, aunque no resulte fácil vislumbrarlo porque es bastante tímido, pero para criar frecuente bosques de distintas especies forestales e incluso zonas de frutales o parques en los que abundan las semillas.

**ÁGUILA REAL** (*Aquila chrysaetos*)

**Longitud:** Entre 76 y 96 cm  
**Envergadura:** Entre 180 y 230 cm

**Hábitat:** Especie residente, habita en los principales sistemas montañosos de la península, prefiriendo zonas con cortados rocosos.

**Alimentación:** Su alimentación es muy variada e incluye mamíferos como conejos, aves como palomas o perdices, reptiles como lagartos y culebras e incluso come carroña.

**Características:** La mayor de las águilas ibéricas y una de las más extendidas y poderosas de todo el mundo. Los adultos se distinguen por una coloración parda oscura con tonos dorados en alas. Su silueta es proporcionada, con alas largas y anchas y cola larga. Los ejemplares jóvenes son más oscuros, casi negros, con parches blancos que se distinguen en sus alas al volar y en gran parte de la cola. Acostumbra a anidar en cantiles o salientes rocosos, aunque ocasionalmente lo hace en árboles.

**BUITRE LEONADO** (*Gyps fulvus*)

**Longitud:** Entre 95 y 110 cm  
**Envergadura:** Entre 230 y 265 cm

**Hábitat:** Especie habitual y residente que anida en paredes rocosas desde las que se lanza a planear buscando las corrientes cálidas.

**Alimentación:** Es uno de los principales carroñeros, alimentándose de cadáveres y limpiando el campo y el monte.

**Características:** Se trata de una de las aves de mayor tamaño y también de las más longevas de toda Europa. De color pardo grisáceo, destaca por su largo cuello pelado —que facilita su entrada en el interior de los cadáveres—, su pico poderoso y su gorguera de plumas alrededor del cuello —que lo asemeja al león y le aporta nombre—. Su silueta en vuelo es inconfundible, con sus alas formando una ligera V, largas y anchas y con una reducida cola. Está presente en toda España, aunque Aragón y Castilla y León concentran prácticamente a la mitad de los individuos. Ante la escasez de carroñas en el campo, por el declive de la ganadería y las normativas sanitarias, frecuenta muladares donde se le da de comer.

**COLLALBA NEGRA** (*Oenanthe leucura*)

**Longitud:** 18 cm  
**Envergadura:** Entre 26 y 29 cm

**Hábitat:** Ave que permanece todo el año entre nosotros. Gusta de escarpes y roquedos de ambientes secos y áridos, desprovistos de vegetación.

**Alimentación:** Su alimentación se basa en el consumo de insectos que captura en el suelo.

**Características:** Su aspecto es bastante característico, con tonalidad oscura, casi negra y cola parcialmente blanca, así como el obispillo. Las hembras cambian el negro por el marrón oscuro. Habita en la península Ibérica y el noroeste de África. En España se asienta en las áreas más cálidas, como el Valle del Ebro, el Levante y el sureste de la Península. La práctica totalidad de la población europea está en España, con una pequeña cantidad en Portugal. Le gusta posarse en lugares prominentes.

**ÁGUILA PERDICERA** (*Aquila fasciata*)

**Longitud:** Entre 60 y 70 cm  
**Envergadura:** Entre 150 y 170 cm

**Hábitat:** Habita en cortados o cañones, preferentemente en clima mediterráneo, permaneciendo todo el año.

**Alimentación:** Su alimentación es variada aunque prefiere aves de tamaño medio como grajillas y perdices, sin hacerle ascos a pequeños mamíferos y reptiles.

**Características:** Es la más ágil de las grandes águilas y la que presenta una coloración más pálida. Parda oscura en la parte superior, la inferior es pálida con pintas alargadas. En vuelo destaca su cuerpo blanquecino contrastando con la parte inferior de las alas más oscuras. Circunscrita al ambiente mediterráneo, abunda en las sierras costeras y en las de este clima. Aunque hay población en otras áreas de Europa, el 75% de los individuos censados se encuentran en España. Como el águila real, gusta de los cortados rocosos para criar, aunque ocasionalmente lo hace en grandes árboles e incluso torres eléctricas.

**ALIMOCHÉ** (*Neophron percnopterus*)

**Longitud:** Entre 55 y 65 cm  
**Envergadura:** Entre 148 y 171 cm

**Hábitat:** Ave rupícola que anida en paredes y cortados. En Aragón es un ave estival, ya que el invierno lo pasa en África.

**Alimentación:** La carroña es la base de su alimentación, aprovechando pequeñas carroñas o los despojos que dejan los buitres de mayor tamaño. Ocasionalmente puede capturar pequeños vertebrados e insectos o rematar animales heridos.

**Características:** De aspecto inconfundible, con su plumaje blanco sucio que se torna negro en las puntas de alas y cola. Su cara y buena parte del pico son amarillos y luce un penacho de plumas desfiladas en cuello y cabeza. Se encuentra en las grandes cordilleras de la península. En Aragón, en todo el Sistema Ibérico y Valle del Ebro, en áreas montañosas y abruptas. Es una especie de interés cuya población ha experimentado un declive importante en los últimos años, especialmente en el Valle del Ebro.


**MIRLO ACUÁTICO** (*Cinclus cinclus*)

**Longitud:** Entre 17 y 20 cm  
**Envergadura:** Entre 25 y 30 cm

**Hábitat:** Reside en la Península a lo largo de todo el año. Especie propia de riberas y cursos de agua.

**Alimentación:** Larvas e insectos acuáticos conforman su dieta principal, siendo un gran especialista en su captura. Ocasionalmente también ingiere pequeños moluscos y crustáceos.

**Características:** De cuerpo rechoncho, cola corta y alas pequeñas, su plumaje alterna el color chocolate en cabeza, cuello y vientre con tonos más oscuros, casi negros, en el dorso, que contrasta con un babero blanco. Su presencia se circunscribe a los cursos de aguas limpias de media y alta montaña. Su dependencia del buen estado ecológico de los ríos y riachuelos en los que habita marcan su presencia. Extendido por toda Europa, Norte de África y Asia, en España aparece dividido en dos subespecies, cinclus, en la zona norte y noroeste de la península y aquaticus en el este y sur. En las montañas del Sistema Ibérico su distribución está más fragmentada.

**OROPÉNDOLA** (*Oriolus oriolus*)

**Longitud:** 24 cm  
**Envergadura:** 45 cm

**Hábitat:** En sotos y bosques de ribera a los que acude entre abril y septiembre, mientras que los inviernos los pasa en África.

**Alimentación:** Su alimentación se basa en invertebrados, fundamentalmente insectos como escarabajos, orugas, moscas, abejas, grillos o saltamontes.

**Características:** El llamativo color dorado del macho hace que sea inconfundible en sus vuelos por las arboledas ribereñas. Su amarillo omnipresente contrasta con las alas y la punta de la cola, de un negro intenso. La hembra muestra tonos más apagados, de un tono más verdoso. Además de los sotos, que es su hábitat preferido, puede verse en robledales, alcornoques, frutales e incluso en grandes jardines. Nidifica desde el nivel del mar hasta los 1600 m, aunque es rara por encima de los 1000 m.



50250 Illueca (Zaragoza)  
 Plaza del Castillo  
**COMARCA DEL ARANDA**



COLABORA

**Comarca del Aranda**

EDITA

[www.comarcadelaranda.com](http://www.comarcadelaranda.com)

**RUTAS ORNITOLÓGICAS**  
**COMARCA DEL ARANDA**

